

TORNEN ELS POLLS

Hem tornat a detectar polls a la classe dels vostres fills i filles. Us demanem la vostra col·laboració per intentar eliminar aquests molestos veïns.

CONDUCTA A SEGUIR EN EL CAS D'INFESTACIÓ PER POLLS

El nen portador de polls ha d'aplicar-se un antiparasitari (Exemple: Permetrina OTC 1.5%):

1. Rentar el cap amb aigua i sabó.
2. Aplicar el gel al clatell i darrera les orelles.
3. Friccionar amb energia durant 5 minuts.
4. Cobrir el cabell amb el gorro durant 20 minuts.
5. Esbandir amb aigua abundant.
6. Fer-ho un cop a la setmana durant 3 setmanes.
7. Pentinar el cabell amb una pinta de pues molt juntes entre sí.

El nen portador de polls pot assistir a escola un cop realitzada la primera aplicació.

No cal tallar el cabell del nen.

No es recomana fer tractament preventiu (locions, gels, vinagre, ...) ni als companys ni als familiars que convisquin amb el nen.

Sí són necessàries mesures higièniques (rentar el cap 3 cops per setmana amb el xampú habitual) i controlar l'aparició de polls cada 2-3 dies.

És important saber que un cop aplicat el preparat, moren els polls i els ous, però els ous queden enganxats fortament al cabell durant dies, per això és important pentinar cada dia amb la pinta especial.

Equip de Pediatria CAP Calella

