

# Suport Vital Bàsic i Desfibril·lació Externa Automàtica



## Comproveu la resposta

Sacsegeu suaument  
Pregunteu-li amb veu forta: "Es troba bé?"



## Si no respon

Obriu la via aèria i comproveu la respiració

Si no respira normalment  
o no respira

Si respira normalment

Telefoneur al 112, aconsegiu un DEA



## Comenceu la RCP immediatament

Col·loqueu les mans al centre del pit  
Feu 30 compressions toràciques


- Comprimiu fermament al menys 5 cm de profunditat a una freqüència de 100/min
- Col·loqueu els llavis al voltant de la boca
- Insufleu amb fermesa fins que el pit pugi
- Doneu la següent ventilació quan el pit baixi
- Continueu la RCP

**RCP 30:2**



## \* Col·loqueu en posició lateral de seguretat

- Telefoneu al 112
- Comproveu que continua respirant amb regularitat



## Engegueu el DEA i col·loqueu elèctrodes

Seguiu les instruccions de veu sense demora  
Col·loqueu un elèctrode sota l'aixella esquerra  
Col·loqueu l'altre elèctrode sota la clavícula dreta, aprop de l'estèrnium  
Si hi ha més d'un reanimador: no interrompre la RCP



## Aparteu-vos i doneu-li una descàrrega

Ningú ha de tocar la víctima  
- durant l'anàlisi  
- durant la descàrrega

Si la víctima comença a despertar: a moure's, a obrir els ulls i respirar normalment, aturar la RCP.  
Si continua inconscient, col·loqueu-la en posició lateral de seguretat\*.